

Critères d'admission en soins palliatifs aigus ou intermédiaires

AIGU

INTERMEDIAIRE

O/N	1. Instabilité de la situation
	Nécessite la révision/adaptation quotidienne des prescriptions
	Nécessite 24/24 du personnel soignant spécialisé pour l'évaluation, l'assistance, la relation d'aide, la surveillance et/ou les interventions de soins
	Baisse rapide de l'état général ou de l'autonomie < 1 semaine
	Echec de RAD. Nécessité de répit, relais, éducation thérapeutique ou apprentissage de mesures d'urgence
	Plus d'une hospitalisation non programmée dans les 6 derniers mois
2. Complexité de la situation	
	Au moins 1 symptôme rebelle ou instable depuis 3 jours
	Douleur malgré un pallier III, ou intolérance au traitement depuis 3 jours
	Vulnérabilité psychique, état confusionnel, capacités de jugement limitées, troubles de la vigilance, de l'adaptation ou anxiété
	Crise existentielle, spirituelle, perte de sens
	Questionnement complexe autour du processus de fin de vie
	Problème social : épuisement des proches aidants
<p>La complexité en soins palliatifs¹ : Fardeau des symptômes ; gestion difficile de la douleur ; statut de performance générale altéré ; facteurs de risques sociaux-familiaux (proches-réseau) et dilemmes éthiques ou existentiels ; ¹Tuca T., Gomez-Martinez M., Prat A. <i>Predictive model of complexity in early PC : a cohort of advanced patients (PELCOM study). Support Care Cancer 2018.</i></p>	
O/N	3. Lourdeur des soins - Traitement et/ou démarche de soins palliatifs lourds/complexes
	Sédation palliative en cours ou imminente, mais non envisageable dans le lieu de soins précédent
	Soins techniques ou procédures de soins complexes, nécessitant des équipements ; ex. dans le cadre de plaies, VNI, trachéostomie, ...
	Interventions de soins > à 90 min par jour
	Soins nécessitant une sédation analgésique
	Prises de décisions difficiles, conflit éthique concernant des mesures de maintien ou prolongation de la vie

- Pour les critères de soins palliatifs **aigus** : « Instabilité⁰ - Complexité² - Lourdeur³ » = **INSTABILITE ET COMPLEXITE sont les plus déterminants**
- Pour les critères de soins palliatifs de **longue durée** (lit intermédiaire), la situation doit être identifiée comme **STABLE** et ne nécessitant pas une évaluation quotidienne des prescriptions par le médecin, et complexité supérieure à la capacité de prise en charge d'un EMS, ou lors d'un maintien à domicile impossible.